

ZINQUEL

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

ZINQUEL SC un fertilizante organomineral líquido para aplicación foliar. Debido a su alta calidad de formulación, todo el zinc es 100% complejo con ácidos carboxílicos, que permite a los tejidos vegetales absorberlo rápidamente con una eficiencia muy alta.

La fertilización foliar con **ZINQUEL SC** permite que el zinc sea fácilmente disponible para cultivos y árboles frutales.



RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS 200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Frijoles, pallares, Garbanzo, arveja, otros	1/2 -1L	1era. Aplicación al inicio del crecimiento vegetativo realizar una segunda aplicación 15 días después.
Cucurbitáceas: melón, sandía, pepinillo, zapallo.	1/2 -1L	Hacer 2 aplicaciones, antes de floración y luego 10-15 días después.
Frutales, Cítricos, Manzano, Melocotón, Vid, Arándanos, Mango	1/2 -1L	Aplicar a los primeros síntomas de deficiencia y repetir cada 15 a 20 días.
Algodón, Pimiento, Tomate, apscum	1/2 -1 L	Aplicar al inicio del crecimiento de los cultivos y repetir cada 15-20 días.
Papa	1/2 -1 L	Aplicar en 2 oportunidades cada 15 - 20 días, iniciar antes de la floración.